

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při mapování současné situace využívání farmak s antikonvulzivním účinkem v České republice u dětí **do 3 let** věku.

Získaná data budou dále sloužit jako jeden z výchozích materiálů pro plánované studie a budou publikována v časopisu pro pediatrii.

Předem Vám děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.

Vaše Jméno

Adresa Vaší ordinace pro děti a dorost

E-mail

Telefon

Kolik Vašich pacientů ve věku 0-3 let chronicky trpí křečovými stavy (vyjma febrilních křečí R56.0) - počet?

Jaké jsou primární diagnózy těchto pacientů (př. epilepsie u n=X pacientů)?

- epilepsie (G40)
- posthypoxická encefalopatie (P91.6)
- dědičná metabolická onemocnění (E70, E71, E72, E74, E75, E76, E77, E79, E80)
- jiné (např. hypomagnezémie E83.4, hypoglykémie u novorozence P70, křeče u novorozence P90, subarachnoidální krvácení I60, intracerebrální krvácení I61, cévní onemocnění mozku NS I67.9, následky poranění hlavy T90, herpetická encefalitida B00.4, nejasný původ aj.), tyto diagnózy vyjmenujte:

Kolik těchto pacientů **dlouhodobě užívá farmaka s antikonvulzivním účinkem** (počet)?

Kdo pacientům antikonvulzivní léčbu **primárně předepsal** (příklad: neurolog = X pacientů)?

- neurolog
- neonatolog
- poradna pro rizikové novorozence
- jiná odbornost, tyto odbornosti vyjmenujte:

Kdo pacienty **sleduje nyní** (příklad: neurolog = X pacientů)?

- neurolog
- neonatolog
- jiná odbornost, tyto odbornosti vyjmenujte:

Kolik z léčených pacientů užívá **fenobarbital v monoterapii (PHENAEMAL, PHENAEMALETEN) a v jakých indikacích** – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.)

Kolik z léčených pacientů užívá **kyselinu valproovou v monoterapii (CONVULEX, DEPAKINE, ORFIRIL) a v jakých indikacích** – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.)

Kolik z léčených pacientů užívá **topiramát v monoterapii (TOPAMAX, TOPILEX, TOPIRAMATE, MYLAN a jiné) a v jakých indikacích** – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.)

Kolik z léčených pacientů užívá **levetiracetam v monoterapii (KEPPRA, LEVETIRACETAM a jiné) a v jakých indikacích** – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.)

Kolik z léčených pacientů užívá **clonazepam v monoterapii (RIVOTRIL) a v jakých indikacích** – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.)

Užívá některý z těchto pacientů **vigabatrin (SABRIL) a v jakých indikacích** - počet?

Užívají někteří Vaši pacienti **do 3 let jiná léčiva s antikonvulzivním účinkem**? Která a počet pacientů?

Kolik z celkového počtu pacientů **vyžaduje kombinovanou léčbu**?

Kolik máte ve své praxi pacientů do 3 let věku?

Zde je prostor pro **Vaše připomínky, poznámky, doplňující odpovědi, vysvětlivky** atp.

Děkujeme Vám za Váš čas. Informace poslouží jako základ pro provedení nekomerčních klinických studií, které umožní zlepšení dávkovacích režimů u dětí trpících křečovými stavy. O výsledcích Vás budeme informovat.

Podpis

Datum

Ve spojení s CzechPharmNet

Kontaktní osoby: MUDr. Pavla Pokorná Ph.D., Prof. MUDr. Ondřej Slanař Ph.D., MUDr. Natálie Švestková (Ph.D. studentka), MUDr. Karolína Hronová Ph.D., Pharm.Dr. Danica Michaličková Ph.D., Prof. Dick Tibboel a Sabina Černá (studentka medicíny)